


پروول ۴۵/۵ % سوسپانسیون کپسوله Prowl 45.5 % CS



یک تیر و چند نشان: کنترل ملیف وسیعی از علفهای هرز پهن برگ
و باریک برگ یکساله در سیب زمینی با یکبار سمپاشی



— حفظ کارایی علفکش در شرایط گرم و خشک با فرمولاسیون جدید کپسوله

— عدم محدودیت در کشت اکثر محصولات در فصل بعدی به دلیل

فرمولاسیون پایه آب و نداشتن باقیمانده در خاک

 **BASF**
We create chemistry

معرفی

پرول علفکشی است با فرمولاسیون پیشرفته برپایه آب که در آن پندی متالین به صورت کپسولهای بسیار کوچک فرموله شده است. این علفکش برای کنترل طیف وسیعی از علفهای هرز پهن برگ و نازک برگ یکساله در سیب زمینی به ثبت رسیده است.

ویژگیها و مزایا


- قابل اعتماد - کیفیت آلمان
- پیشگیری از بروز خسارت در سیب زمینی با کنترل علفهای هرز قبل از ظهور
- کاهش هزینه ها با کنترل طیف وسیعی از علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ یکساله با یکبار سمپاشی
- حفظ کارایی علفکش در شرایط گرم و خشک و عدم محدودیت برای کشت اکثر محصولات در فصل بعد با فرمولاسیون جدید کپسوله بر پایه آب
- گزینه ای مناسب برای استفاده در سیستمهای بی خاکورزی (شخم حداقل)
- جایگزینی جدید و موثر جهت مدیریت بروز مقاومت در علفهای هرز با توجه به تنوع کم علفکش های موجود در بازار

زمان و میزان مصرف

پرول به میزان ۳ لیتر در هکتار به منظور کنترل علفهای هرز سیب زمینی به ثبت رسیده است. بهترین زمان مصرف به صورت پیش رویشی، پس از کاشت سیب زمینی، بعد از آبیاری اول و قبل از رویش علفهای هرز می باشد.

ویژگی مهم


پرول هم از راه جوانه ها و هم از راه ریشه ها جذب می گردد.



نقاط جذب پرول در علفهای هرز

کنترل مناسب علفهای هرز توسط پرول در سیب زمینی

(منبع: آزمایشات انجام شده توسط شرکت بازرگان کالا در شهرستان جیرفت)



نکات مهم

- ۱- از کاربرد پرول پیش از کاشت سیب زمینی خودداری شود.
- ۲- از کاربرد پرول بیش از یکبار در هر فصل خودداری شود.
- ۳- از کاربرد پرول روی سیب زمینی شیرین اجتناب نمایید.
- ۴- از کشت چغندر قند، چغندرلبویی و اسفناج تا ۱۲ ماه پس از سمپاشی خودداری نمایید.
- ۵- در صورت وقوع بارندگی یا آبیاری به میزان کافی در طول فصل برای محصول قبلی، گندم و جو می توانند تا ۴ ماه پس از سمپاشی با پرول کشت گردند.
- ۶- از کاربرد علفکش همراه با آب آبیاری خودداری گردد.
- ۷- وجود رطوبت کافی و حفظ آن برای باز شدن کپسول ها و آزاد شدن مولکولهای علفکش ضروری است.


علفهای هرز مهمی که توسط پرول کنترل می گردند:



هفت بند



سلمه تره



تاج خروس



شقاییق



تاج ریزی



کیسه کشیش




خرفه



سوروف



سیزاب



فرفیون



ارزن وحشی



پنجه مرغی



چغندر وحشی



چمن یکساله



شرکت نهاده گستر گوهر ثمر

شرکت نهاده گستر گوهر ثمر:

نماینده فنی و فروش شرکت ب آ اس اف آلمان در استان های فارس، بوشهر، هرمزگان و کهکیلویه و بویر احمد
شیراز: فلکه مصدق، بلوار غدیر، نبش کوچه یک، تلفن: ۴-۳۷۲۵۴۵۵۳-۰۷۱ - www.nahadehgostar.com

شرکت ب آ اس اف ایران (سهامی خاص)

خیابان سهروردی شمالی، ضلع شمالی منبع آب
کوچه کنگاور، شماره ۵

کدپستی: تهران ۱۵۵۷۹۵۷۱۱۱

صندوق پستی: ۴۶۱۹ - ۱۱۱۵۵

تلفن: ۸۸۷۶۸۲۳۷

فاکس: ۸۸۷۶۲۸۹۴

basf.iran@basf.com